

АЦЕРБИН (ACERBINE)

MALIC ACID, BENZOIC ACID, SALICYLIC ACID

зарегистрировано и произведено

Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT Ges.m.b.H. (Австрия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА**Раствор для наружного применения** 100 г

DL-яблочная кислота 2.153 г

бензойная кислота 0.154 г

салициловая кислота 0.041 г

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 39.439 г, вода очищенная – 58.213 г.

80 мл – флаконы пластиковые (1) с распыляющей насадкой – коробки картонные.

Номер и дата регистрации: П N014168/01 от 14.08.09**Код АТХ:** D08A**Клинико-фармакологическая группа:**

Антисептик для наружного применения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.

ПОКАЗАНИЯ

При комплексном лечении:

- поверхностных ожогов кожи;
- длительно незаживающих ран;
- трофических язв;
- пролежней.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно. После хирургической обработки ран и ожогов раствор наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или раствор наносят на перевязочный материал, а затем на рану 2-3 раза в день. После начала эпителизации наносить 1 раз в день.

В случае отсутствия аллергических реакций лечение может продолжаться до полного заживления раны или ожога.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ*Местные реакции:* жжение в месте нанесения, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата. Возможны аллергические реакции.**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

– повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Возможно применение препарата во время беременности и при кормлении грудью.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Следует избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз.

Если применение препарата не дает ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу.

При ожогах с большой площадью поражения лечение должно производиться только под наблюдением врача.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Претензии потребителей направлять по адресу:

Представительство компании "Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х."

Адрес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3

Тел./факс: 8(495)781-71-08

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаев передозировки не выявлено.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Салициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, нанесенными на ту же область.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от +15°C до +25°C. Срок годности – 5 лет.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

ФАРМАЦОЙТИШЕ ФАБРИК МОНТАВИТ Гез.м.б.Х.

Представительство в России
125212 Москва, ул. Адмирала Макарова 8, эт. 2
Тел.: (495) 781-71-08
Тел./факс: (495) 974-82-83