

## КАНДИД (CANDID) для местного применения

CLOTRIMAZOLE

зарегистрировано и произведено  
GLENMARK PHARMACEUTICALS Ltd. (Индия)

### ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ *Раствор для местного применения* бесцветный, прозрачный, вязкий.

1 мл

клотримазол..... 10 мг

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль, глицерол.

15 мл – флакон-капельницы полиэтиленовые (1) – пачки картонные.

**Номер и дата регистрации:** П N014637/02 от 18.08.08

**Код АТХ:** A01AB18

### Клинико-фармакологическая группа:

Препарат с противогрибковым действием для обработки полости рта

### ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения, производное имидазола. Антимикотический эффект связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменение ее структуры и свойств и приводит к лизису клетки.

К клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжеподобные грибы (рода *Candida*, *Torulopsis glabrata*, *Rhodotorula*), плесневые грибы, а также возбудитель разноцветного лишая *Pityriasis versicolor* и возбудитель эритразмы.

Оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (*Bacteroides*, *Gardnerella vaginalis*), а также в отношении *Trichomonas vaginalis*.

При местном применении клотримазола абсорбция клотримазола со слизистых оболочек незначительна.

### ПОКАЗАНИЯ

– кандидозный стоматит.

### РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

10-20 капель (0.5-1 мл) препарата Кандид наносят на пораженные участки полости рта 3-4 раза/сут, желательно с помощью ватной палочки. Улучшение состояния наступает обычно на 3-5 день лечения, однако лечение необходимо продолжить до полного устранения клинических проявлений заболевания.

### ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат обычно хорошо переносится.

В *редких случаях*, при гиперчувствительности к компонентам препарата, отмечаются аллергические реакции – покраснение слизистой оболочки полости рта, ощущение жжения и покалывания на месте нанесения препарата, крапивница. При возникновении раздражения препарат необходимо отменить.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– гиперчувствительность к компонентам препарата.

### БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Применение препарата Кандид при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) допускается в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает риск для плода или младенца.

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Кандид предназначен только для местного применения в полости рта.

### ПЕРЕДОЗИРОВКА

Острая передозировка при местном применении Кандида маловероятна и не приводит к ситуации, представляющей угрозу для жизни.

### ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении с амфотерицином В, нистатином активность клотримазола может снижаться.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта.

**ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ Лтд.**

Представительство в России  
ООО "Гленмарк Импэкс"  
115114 Москва, Летниковская ул. 2, стр. 3  
БЦ "Вивальди Плаза"  
Тел.: (495) 723-72-90  
Факс: (495) 723-72-90 (доб. 801)