

КАРИПАЗИМ (CARIPAZYM)

PAPAIN

МЕДФЛОРИНА ООО

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения 1 фл.
папаин (протеазы плодов папайи) 350 ПЕ

флаконы (1) – пачки картонные.

флаконы (10) – коробки картонные.

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения 1 фл.
папаин (протеазы плодов папайи) 700 ПЕ

флаконы (1) – пачки картонные.

флаконы (10) – коробки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛСР-002813/09 от 08.04.09

Код АТХ: D03BA

Клинико-фармакологическая группа:

Препарат с протеолитической активностью для наружного применения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Протеолитическое средство для наружного применения. Расщепляет некротизированные ткани, разжижает вязкие секреты, экссудат. Близок по действию к трипсину и химотрипсину.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При наружном применении препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.

ПОКАЗАНИЯ

– ожоги III-а степени (для ускорения отторжения струпов и для очищения гранулирующих ран от гнойно-некротических масс).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно, в виде растворов 35 ПЕ/мл или 70 ПЕ/мл, в зависимости от толщины струпа. Содержимое флакона разводят в 10 мл 0.5% растворе новокаина или 0.9% растворе натрия хлорида. Раствор готовят непосредственно перед употреблением. Салфетку, смоченную препаратом, накладывают на ожоговую поверхность, закрывают влагонепроницаемой повязкой, которую меняют 1 раз/сут или через день, удаляя отслоившиеся некротизированные ткани. Одновременно обрабатывают не более 30% общей поверхности тела. Курс лечения от 4 до 12 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– беременность и период лактации;
– повышенная чувствительность к препарату.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаев передозировки не описано.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности – 1 год 6 мес.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

По рецепту.