

КУРИОЗИН® (CURIOSIN)

зарегистрировано ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС ЗАО (Россия)
произведено GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Раствор для наружного применения бесцветный или слабо окрашенный, прозрачный, вязкий.

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| | 1 мл | 1 фл. |
| гиалуронат цинка* | 2.05 мг | 20.5 мг |

* произведено по прописи: натрия гиалуронат – 20 мг, цинка хлорид – 10.5 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат – 10 мг, сорбитол – 464 мг, вода д/и – до 10 мл.

10 мл – флакон-капельницы полиэтиленовые (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N011511/02 от 17.04.09

Код АТХ: D03AX05

Клинико-фармакологическая группа:

Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, с противомикробной активностью для наружного применения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Стимулятор репарации тканей. При взаимодействии гиалуроновой кислоты с молекулами воды возникает дисперсионный матрикс, восполняющий недостающую клеточную ткань. Он образует естественный поддерживающий каркас для клеток, участвующих в заживлении раны, повышает активность гранулоцитов и макрофагов, усиливает пролиферацию фибробластов и ангиогенез. По сравнению с гиалуронатом натрия, гиалуронат цинка оказывает бактериостатическое действие в отношении многих бактерий.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При местном применении практически не всасывается, в плазме определяется незначительное количество препарата.

ПОКАЗАНИЯ

– в составе комплексной терапии для местного лечения плохо заживающих, инфицированных ран, язв голени, пролежней, свищей, а также для ускорения нормального заживления ран.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Наружно. Раствор наносят 1 раз/сут на поврежденные участки кожи в максимальной дозе 1 капля/см².

После предварительного промывания поверхности раны физиологическим раствором или при необходимости 3% раствором перекиси водорода следует нанести несколько капель раствора Куриозин® на марлевую салфетку в количестве, необходимом для равномерного увлажнения всей раневой поверхности в максимальной дозе 1 капля/см². Покрывать рану стерильной марлевой салфеткой или бинтом, не липнущим к раневой поверхности. На сильно мокнущие раны раствор можно наносить 2 раза/сут. Длительность терапии индивидуальна и зависит от формы и тяжести заболевания.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В начале лечения возможно ощущение легкого жжения, которое постепенно исчезает.

Очень редко на прилегающих участках кожи возможно проявление аллергических реакций (раздражение и контактный дерматит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Нет данных о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не вызывает фотосенсибилизации, не окрашивает кожу и белье.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Не описана.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАМОДЕЙСТВИЕ

Данные о взаимодействии с другими лекарственными препаратами не предоставлены.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.

ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО
119049 Москва, 4-й Добрынинский пер. 8
Тел.: (495) 363-39-50
Факс: (495) 363-39-49