

ГЕПАБЕНЕ (HEPABENE)

FUMARIAE HERBA, CARDUI MARIAE FRUCTUS

зарегистрировано

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль)

произведено

MERCCKLE GmbH (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Капсулы твердые желатиновые, размер №0, светло-коричневого цвета; содержимое капсул – порошок от оранжево-коричневого до светло-коричневого цвета, с более светлыми включениями.

1 капс.

сухой экстракт травы дымянки лекарственной..... 275.1 мг,

что соответствует сумме фумаровых алкалоидов в пересчете на протопин..... 4.13 мг

сухой экстракт плодов расторопши пятнистой..... 83.1 мг,

что соответствует содержанию силимарина 50 мг,

в т.ч. силибинина не менее 22 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая – 80.1 мг, крахмал кукурузный – 20.1 мг, тальк – 8.4 мг, макрогол 6000 – 4.5 мг, кополивидон – 4.5 мг, магния стеарат – 2.1 мг, кремния диоксид – 2.1 мг.

Состав капсульной оболочки: желатин – 79.94 мг, железа оксид желтый – 0.67 мг, железа оксид красный – 0.15 мг, железа оксид черный – 0.04 мг, титана диоксид – 1.29 мг, вода очищенная – 13.92 мг.

10 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N012369/01 от 17.10.07**Код АТХ:** A05AX**Клинико-фармакологическая группа:**

Фитопрепарат с гепатопротекторным и желчегонным действием

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комбинированный препарат растительного происхождения, содержит экстракт дымянки лекарственной и экстракт расторопши пятнистой.

Экстракт дымянки лекарственной, содержащий алкалоид фумарин, нормализует количество секретируемой желчи, снимает спазм желчного пузыря и желчных протоков, облегчая поступление желчи в кишечник.

Экстракт плодов расторопши содержит силимарин, который проявляет гепатопротекторное действие при острых и хронических интоксикациях, связывает свободные радикалы и токсические вещества в ткани печени, обладает антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью, стимулирует синтез белка, способствует восстановлению клеток печени.

Гепабене нормализует функцию печени при различных хронических патологических состояниях.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

После приема внутрь флавоноиды, входящие в состав силимарина, экскретируются преимущественно с желчью и подвергаются кишечечно-печеночной рециркуляции.

ПОКАЗАНИЯ

- в составе комплексной терапии дискинезии желчевыводящих путей (в т.ч. после холецистэктомии);
- в составе комплексной терапии при хронических гепатитах;
- в составе комплексной терапии при хронических токсических поражениях печени.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат следует принимать внутрь во время еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым препарат назначают по 1 капсуле 3 раза/сут.

При ночном болевом синдроме рекомендуется дополнительно принимать еще 1 капсулу перед сном.

При необходимости суточную дозу препарата можно увеличить до 6 капсул (максимальная суточная доза) в 3-4 приема в течение дня.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно: аллергические реакции.

Иногда: послабляющее действие, увеличение диуреза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- острые воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей;
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время лечения препаратом пациенты должны принимать только назначенные лечащим врачом лекарственные средства, строго соблюдать предписанные режим и диету, воздерживаться от употребления алкоголя.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

До настоящего времени явления передозировки не описаны.

В случаях передозировки пациент должен срочно обратиться к лечащему врачу.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

До настоящего времени не описаны.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается по рецепту.

HPBN-RU-00002-DOK-PHARM

Тева ООО

115054 Москва, Валовая ул. 35

Бизнес-Центр "Wall Street"

Тел.: (495) 644-22-34