

ЛАКТАГЕЛЬ (LACTAGEL)

зарегистрировано
ОРИОН ФАРМА ООО (Россия)
произведено
ROLF KULLGREN AB (Швеция)

ФОРМА ВЫПУСКА, СОСТАВ И УПАКОВКА

Гель вагинальный **1 тубик**
молочная кислота 225 мг

Вспомогательные вещества: гликоген, пропиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лактат, вода.
рН 3.8

5 мл – тубики одноразовые (7) – упаковки.

Номер и дата регистрации: ФСЗ 2010/08335 от 13.11.10

СВОЙСТВА

Гель, содержащий молочную кислоту и гликоген.

Молочная кислота способствует снижению рН влагалища (т.е. созданию более кислой среды).

Гликоген является питательной средой, необходимой для размножения лактобактерий.

Нормализуя значения рН и создавая соответствующие условия для размножения лактобактерий, Лактагель восстанавливает естественную среду во влагалище и устраняет симптомы (обильные выделения, дискомфорт и неприятный запах).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- облегчение симптомов бактериального вагиноза;
- поддержание нормальной флоры влагалища и профилактика симптомов бактериального вагиноза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<i>Лечение бактериального вагиноза</i>	
Устранение симптомов бактериального вагиноза – обильных выделений, неприятного запаха, влагалищного дискомфорта	Применять 1 тубик ежедневно в течение 7 дней
<i>Поддержание нормальной флоры влагалища и профилактика симптомов бактериального вагиноза</i>	
Поддержание естественных значений рН влагалища и профилактика появления симптомов бактериального вагиноза	Применять по 1 тубику 1 раз в 3 суток в течение 3 месяцев
Поддержание естественных значений рН влагалища во время курса антибиотикотерапии и/или лечения противогрибковыми препаратами	Применять по 1 тубику ежедневно в конце курса в течение 4-5 суток
Устранение симптомов бактериального вагиноза в период менструации	По окончании менструации применять по 1 тубику в сутки в течение 1-2 дней.

Способ применения

Лактагель выпускается в тубиках для одноразового применения.

1. Чтобы открыть тубик, следует повернуть колпачок и снять его.
2. Необходимо полностью вставить наконечник тубика во влагалище.
3. Сдавить стенки тубика; не прекращая сдавливать, следует удалить тубик.
4. После этого тубик можно выбросить.

Лучше всего использовать Лактагель перед сном, т.к. некоторое количество геля может вытечь. Рекомендуется применять гигиенические прокладки для белья.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Лактагель можно применять при беременности, однако при подозрении на наличие вагинальной инфекции во время беременности рекомендуется обратиться к врачу.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Следует избегать применения Лактагеля во время попыток зачатия естественным путем, т.к. низкие значения рН влагалища негативно сказываются на активности сперматозоидов.

Лактагель не следует применять в качестве средства контрацепции.

Не использовать тубик при нарушении его целостности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Лактагель следует хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Срок годности – 3 года.

Не использовать после истечения срока годности.