МЕМОПЛАНТ (MEMOPLANT®) 40 мг

GINKGO LEAF

зарегистрировано и произведено
Dr. WILLMAR SCHWABE GmbH & Co.KG (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** коричневато-желтого цвета, гладкие, круглые.

	1 таб.
сухой экстракт листьев гинкго двулопастного* (EGb 761®**) (35-67:1) стандартизованный по содержанию	40 мг,
флавонгликозидов	9.8 мг
терпенлактонов	2.4 мг
(1.12-1.36 мг гликозидов A, B, C и 1.04-1.28 мг билобалиды)	

Экстрагент: ацетон 60%.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 115 мг, кремния диоксид коллоидный – 2.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 60 мг, крахмал кукурузный – 25 мг, кроскармеллоза натрия – 5 мг, магния стеарат – 2.5 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза – 9.25 мг, макрогол 1500 – 4.625 мг, пеногасящая эмульсия SE2 – 0.008 мг***, титана диоксид (E171) – 0.38 мг, железа гидроксид (E172) – 1.16 мг, тальк – 0.576 мг.

10 шт. – блистеры (1) – пачки картонные.
10 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.
10 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.
10 шт. – блистеры (5) – пачки картонные.
15 шт. – блистеры (1) – пачки картонные.
15 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.
15 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.
15 шт. – блистеры (5) – пачки картонные.
20 шт. – блистеры (1) – пачки картонные.
20 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.
20 шт. – блистеры (3) – пачки картонные.
20 шт. – блистеры (5) – пачки картонные.

* сухой экстракт получен из листьев гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), семейство: гинкговые (Ginkgoaceae);

** экстракт Ginkgo biloba (производитель Schwabe Extracta GmbH & Co.KG, Германия или Wallingstown Company Ltd. / Cara Partners, Ирландия) EGb 761® (номер, присвоенный экстракту производителем);

*** статьи Евр.Ф. на отдельные компоненты пеногасящей эмульсии SE2.

Номер и дата регистрации: П N013513/01 от 17.01.08

Код АТХ: N06DX02

Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат, улучшающий мозговое и периферическое кровообращение

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Ангиопротекторный препарат растительного происхождения. Повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга. Тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга. Улучшает мозговое и периферическое кровообращение, улучшает реологические свойства крови.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Действие препарата Мемоплант является совокупным действием компонентов экстракта листьев гинкго билоба, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

ПОКАЗАНИЯ

- органические, возникающие вследствие возрастных нарушений мозгового кровообращения, и функциональные нарушения головного мозга с такими проявлениями, как ухудшение памяти, снижение способности к концентрации внимания и интеллектуальных возможностей, подавленное настроение, головокружение, шум в ушах, головная боль;
- нарушения периферического кровообращения (облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей с такими характерными симптомами, как перемежающаяся хромота, онемение и похолодание стоп, болезнь Рейно);
- нарушения функции внутреннего уха, проявляющиеся головокружением, неустойчивой походкой и шумом в ушах.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи. Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

Для *симптоматического лечения расстройств мозгового кровообращения* назначают по 1-2 таб. (40-80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761®) 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения – не менее 8 недель.

При *нарушениях периферического кровообращения* назначают по 1 таб. (40 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761®) 3 раза/сут или по 2 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761®) 2 раза/сут. Продолжительность курса лечения – не менее 6 недель.
При *сосудистой или инволюционной патологии внутреннего уха* назначают по 1 таб. (40 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761®) 3 раза/сут или по 2 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761®) 2 раза/сут. Продолжительность курса лечения – 6-8 недель.
Если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное количество препарата, последующий прием следует проводить так, как это указано в инструкции, без каких-либо изменений.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции: возможны покраснение, кожная сыпь, отечность кожи, зуд.
Со стороны ЦНС: редко – головная боль, головокружение.
Со стороны свертывающей системы крови: возможно снижение свертываемости крови; в единичных случаях – кровотечения, наблюдавшиеся у пациентов, одновременно принимавших средства, снижающие свертываемость крови (связь данных кровотечений с приемом препаратов гинкго двулопастного EGb 761® не подтверждена).
Прочие: желудочно-кишечные расстройства; нарушение слуха.
В случае развития побочных эффектов пациенту следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

− пониженная свертываемость крови;
− эрозивный гастрит;
− язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
− острые нарушения мозгового кровообращения;
− острый инфаркт миокарда;
− непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы;
− детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с недостаточными данными);
− повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С *осторожностью* следует назначать препарат пациентам с эпилепсией.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

В связи с отсутствием достаточных клинических данных не рекомендуется применять препарат Мемоплант при беременности и в период лактации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Пациент должен быть информирован о том, что при часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом. В случае внезапного ухудшения или потери слуха нужно незамедлительно обратиться к врачу.
На фоне применения препаратов гинкго двулопастного у пациентов, страдающих эпилепсией, возможно появление эпилептических припадков.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Мемоплант не сообщалось. Мемоплант обладает хорошей переносимостью.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не рекомендуется применение препарата Мемоплант пациентам, постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту, антикоагулянты (прямого и непрямого действия), а также препараты, снижающие свертываемость крови.
Не рекомендуется одновременное применение препаратов гинкго билоба с эфавирензом, т.к. возможно снижение его концентрации в плазме крови вследствие индукции CYP3A4 под влиянием гинкго билоба.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. Срок годности – 5 лет.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ
Представительство
коммандитного товарищества в России
119435 Москва
Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16
Тел.: (495) 665-16-92/93
Факс: (495) 665-16-94