

**РЕГУЛАКС® ПИКОСУЛЬФАТ
(REGULAX® PICOSULPHATE)**

SODIUM PICOSULFATE

KREWEL MEUSELBACH GmbH

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА◇ *Капли для приема внутрь***1 мл (15 капель)**

натрия пикосульфат 7.5 мг

10 мл – флакон-капельницы темного стекла (1) – пачки картонные.

20 мл – флакон-капельницы темного стекла (1) – пачки картонные.

50 мл – флакон-капельницы темного стекла (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N011499/01 от 15.12.08**Код АТХ:** А06АВ08**Клинико-фармакологическая группа:**

Слабительный препарат, стимулирующий перистальтику кишечника

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Слабительное средство. Активная форма препарата, образующаяся путем гидролиза под влиянием кишечных микроорганизмов, непосредственно возбуждает нервные структуры кишечной стенки, в результате чего ускоряется продвижение кишечного содержимого, уменьшается всасывание электролитов и воды. Действие наступает через 10-12 ч после приема.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

После приема внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

ПОКАЗАНИЯ

- атонический запор;
- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса);
- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Внутрь, перед сном. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают. **Взрослые:** начальная доза – 13 капель, при *стойком запоре* – до 26 капель. Для **детей старше 4 лет** начальная доза – 5-8 капель. Курс лечения – 7 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны: диарея, абдоминальные боли, вздутие живота, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение АД.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- абдоминальные боли (неясного генеза);
- кровотечения из ЖКТ;
- метроррагия;
- цистит;
- тяжелая дегидратация;
- спастический запор;
- детский возраст (до 4 лет);
- беременность (I триместр);
- повышенная чувствительность к препарату.

С *осторожностью* – период лактации.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Противопоказано в I триместре беременности. Многократный прием препарата во время II и III триместров должен осуществляться только после тщательной оценки необходимости и рисков, поскольку нет достаточной информации о применении препарата при беременности.

С *осторожностью* – период лактации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не следует принимать без врачебного контроля более 7 дней. Долгосрочный прием часто ведет к усилению закрепления кишечника.

У детей следует применять только по согласованию с врачом.

Подходит для больных диабетом; содержит заменители сахара; 1 мл соответствует 0.03 ХЕ.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки, вторичного гиперальдостеронизма, мочекаменной болезни, поражения почечных канальцев.

Лечение: промывание желудка, коррекция нарушений водно-электролитного баланса, спазмолитические средства.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам.

Глюкокортикостероиды, диуретики увеличивают риск развития электролитных нарушений.

Антибиотики широкого спектра действия снижают послабляющий эффект.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от 15°C до 25°C, в недоступном для детей месте. Срок годности – 5 лет.

Срок годности после вскрытия флакона – 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.