# СЕПТОЛЕТЕ® НЕО
# (SEPTOLETE® NEO)

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE

*зарегистрировано и произведено*
*KRKA d.d. (Словения)*

## ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ ***Пастилки яблочные*** круглые, двояковыпуклые, зеленого цвета; допускается наличие незначительных вкраплений более светлого цвета.

**1 пастилка**

цетилпиридиния хлорид моногидрат ..... 1.26 мг,
соответствует цетилпиридиния хлориду ..... 1.2 мг

*Вспомогательные вещества:* мальтитол жидкий (сухое вещество) – 476.64 мг, маннитол – 163.88 мг, левоментол – 2 мг, масло лимона – 3 мг, ароматизатор яблочный – 10 мг, краситель желтый (Е100) (краситель куркумин (Е100), лимонная кислота, натрия бензоат, сахароза, вода, камедь акации) – 0.65 мг, краситель зеленый (Е141) (краситель хлорофилл медный (Е141), лимонная кислота, желатин, сахароза, вода) – 1.95 мг, глицерол – 3.5 мг, масло касторовое – 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный – 1 мг, магния стеарат – 3 мг, титана диоксид (Е171) – 3 мг, повидон – 2.5 мг, капол 600 фарма (воск пчелиный, воск карнаубский, шеллак) – 2.5 мг, мальтитол – до 1200 мг.
9 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.

✧ ***Пастилки лимонные*** круглые, двояковыпуклые, желтого цвета; допускается наличие незначительных вкраплений более светлого цвета.

**1 пастилка**

цетилпиридиния хлорид моногидрат ..... 1.26 мг,
соответствует цетилпиридиния хлориду ..... 1.2 мг

*Вспомогательные вещества:* мальтитол жидкий (сухое вещество) – 476.64 мг, маннитол – 163.88 мг, левоментол – 2 мг, масло лимона – 3 мг, ароматизатор лимонный – 3 мг, ароматизатор цитрусовый – 3 мг, масло апельсина – 4 мг, краситель желтый (Е100) (краситель куркумин (Е100), лимонная кислота, натрия бензоат, сахароза, вода, камедь акации) – 2.6 мг, глицерол – 3.5 мг, масло касторовое – 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный – 1 мг, магния стеарат – 3 мг, титана диоксид (Е171) – 3 мг, повидон – 2.5 мг, капол 600 фарма (воск пчелиный, воск карнаубский, шеллак) – 2.5 мг, мальтитол – до 1200 мг.
9 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.

✧ ***Пастилки черешневые*** круглые, двояковыпуклые, от розового до розового с сиреневым оттенком цвета, допускается наличие незначительных вкраплений более светлого цвета.

**1 пастилка**

цетилпиридиния хлорид моногидрат ..... 1.26 мг,
соответствует цетилпиридиния хлориду ..... 1.2 мг

*Вспомогательные вещества:* мальтитол жидкий (сухое вещество) – 476.64 мг, маннитол – 163.88 мг, левоментол – 2 мг, масло лимона – 3 мг, ароматизатор черешневый – 10 мг, краситель фиолетовый (Е120) (карминовая кислота (Е120), раствор натрия гидроксида, лимонная кислота) – 2.6 мг, глицерол – 3.5 мг, масло касторовое – 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный – 1 мг, магния стеарат – 3 мг, титана диоксид (Е171) – 3 мг, повидон – 2.5 мг, капол 600 фарма (воск пчелиный, воск карнаубский, шеллак) – 2.5 мг, мальтитол – до 1200 мг.
9 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.

**Номер и дата регистрации:** ЛСР-000075 от 25.05.07

**Код АТХ:** R02AA06

**Клинико-фармакологическая группа:**
Антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Цетилпиридиния хлорид – антисептик из группы четвертичных аммониевых соединений, обладает противомикробным, противогрибковым и вирулицидным действием.

## ФАРМАКОКИНЕТИКА

Четвертичные аммониевые соединения, к которым относится цетилпиридиния хлорид, всасываются только на 10-20%. Не всосавшаяся часть выводится через кишечник в неизмененном виде.

## ПОКАЗАНИЯ

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:
− фарингит, ларингит, начальная стадия ангины;
− воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

## РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Пастилку следует рассасывать в полости рта до полного растворения. Пастилки не следует принимать непосредственно перед или во время приема пищи.

**Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет** рекомендуется принимать пастилки каждые 2-3 ч, но не более 8 пастилок/сут.
**Детям в возрасте старше 4 лет** рекомендуется принимать пастилки каждые 3-4 ч, но не более 4 пастилок/сут.
**Детям в возрасте от 10 до 12 лет** рекомендуется принимать пастилки каждые 3-4 ч, но не более 6 пастилок/сут.

### ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Побочные эффекты наблюдаются редко, если принимать пастилки Септолете® Нео в рекомендованных дозах.
*Возможно:* аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея), при проявлении которых применение препарата следует прекратить.
Препарат содержит полиолы (мальтитол, маннитол), которые могут в больших дозах вызвать диарею, особенно у детей.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

− детский возраст до 4 лет;
− повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Септолете® Нео следует с осторожностью применять при беременности и в период грудного вскармливания.

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Пастилки не следует принимать при наличии открытых ран в полости рта, поскольку цетипиридиния хлорид замедляет заживление ран.
При тяжелых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой, головной болью и рвотой, следует проконсультироваться у врача, особенно если состояние не улучшается в течение 3 дней.
Пациентов с сахарным диабетом следует информировать о том, что в 1 пастилке содержится около 1 г мальтитола. Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, но из-за медленного гидролиза и всасывания в ЖКТ гликемический индекс низкий. Энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г или 2.4 ккал/г) также значительно ниже, чем у сахарозы.
Не следует принимать более высокие дозы, чем рекомендуется.
*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*
Пастилки не оказывают воздействия на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

### ПЕРЕДОЗИРОВКА

Учитывая количество активного вещества, содержащегося в 1 пастилке, возможность передозировки минимальная.
*Симптомы:* при превышении рекомендуемых доз – нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота и диарея).
*Лечение:* следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Пастилки не следует принимать с молоком, поскольку возможно снижение противомикробной активности цетилпиридиния хлорида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 2 года.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

**КРКА ФАРМА ООО**
123022 Москва, 2-я Звенигородская ул. 13
стр. 41, эт. 5; стр. 43, эт. 6
Тел.: (495) 981-10-95; Факс: (495) 981-10-91