

СМЕКТА® (СМЕСТА®)

DIOSMECTITE

зарегистрировано
IPSEN PHARMA (Франция)
произведено
BEAUFOR IPSEN INDUSTRIE (Франция)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый)** от серовато-белого до светлого серовато-желтого цвета, от слабого неспецифического до слабого ванильного запаха.

1 пак.

смектит диоктаэдрический..... 3 г

Вспомогательные вещества: ароматизатор апельсиновый – 10 мг, ароматизатор ванильный – 50 мг, декстрозы моногидрат – 679 мг, натрия сахаринат – 21 мг.

3.76 г – пакетики бумажные ламинированные (10) – пачки картонные.

3.76 г – пакетики бумажные ламинированные (30) – пачки картонные.

✧ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (ванильный)** от серовато-белого до светлого серовато-желтого цвета, от слабого неспецифического до слабого ванильного запаха.

1 пак.

смектит диоктаэдрический..... 3 г

Вспомогательные вещества: ванилин – 4 мг, декстрозы моногидрат – 749 мг, натрия сахаринат – 7 мг.

3.76 г – пакетики бумажные ламинированные (10) – пачки картонные.

3.76 г – пакетики бумажные ламинированные (30) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N015155/01 от 08.04.08

Код АТХ: А07ВС05

Клинико-фармакологическая группа:

Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противодиарейный препарат, представляет собой алюмосиликат природного происхождения. Оказывает адсорбирующее действие.

Стабилизирует слизистый барьер ЖКТ, образует поливалентные связи с гликопротеидами слизи, увеличивает количество слизи и улучшает ее цитопротекторные свойства (в отношении отрицательного действия ионов водорода соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов и их токсинов).

Обладает селективными сорбционными свойствами, которые объясняются его дискоидно-кристаллической структурой; адсорбирует находящиеся в просвете ЖКТ бактерии, вирусы.

Смекта® в терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Диосмектит является рентгенопрозрачным и не окрашивает стул.

Алюминий в составе диосмектита не всасывается из ЖКТ, в т.ч. при заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся симптоматикой колита и колонопатии.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Смекта® не абсорбируется. Выводится из организма в неизменном виде.

ПОКАЗАНИЯ

- острая и хроническая диарея (аллергического, лекарственного генеза; при нарушении режима питания и качественного состава пищи);
- диарея инфекционного генеза (в составе комплексной терапии);
- симптоматическое лечение изжоги, вздутия и дискомфорта в животе и других симптомов диспепсии, сопровождающих заболевания органов ЖКТ.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Острая диарея

Взрослым рекомендуется применять 6 пакетиков в сутки.

Детям в возрасте до 1 года – по 2 пакетика/сут в течение 3 дней, затем 1 пакетик/сут; **детям старше 1 года** – 4 пакетика/сут в течение 3 дней, затем – 2 пакетика/сут.

Другие показания

Взрослым назначают по 3 пакетика/сут.

Детям в возрасте до 1 года – 1 пакетик/сут, **в возрасте 1-2 лет** – 1-2 пакетика/сут; **старше 2 лет** – 2-3 пакетика/сут.

Рекомендуется курс лечения 3-7 дней.

При *эзофагите* препарат Смекта® следует принимать внутрь после еды, при других показаниях – между приемами пищи.

Правила приема препарата

Для **взрослых** содержимое пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды, постепенно высыпая порошок и равномерно его размешивая. Назначенную дозу распределяют на 3 приема в течение дня.

Для **детей** содержимое пакетиков растворяют в детской бутылочке (50 мл) и распределяют на несколько приемов в течение дня или перемешивают с каким-либо полужидким продуктом (каша, пюре, компот, детское питание).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Со стороны пищеварительной системы: в клинических исследованиях редко – запор (слабо выражен, проходил после коррекции дозы препарата).

Аллергические реакции: в рутинной практике очень редко – крапивница, сыпь, зуд, отек Квинке.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- кишечная непроходимость;
- непереносимость фруктозы, синдром нарушенного всасывания глюкозы-галактозы;
- недостаточность сахаразы-изомальтазы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Препарат Смекта® разрешен к применению при беременности и в период лактации по показаниям. Коррекция режима дозирования не требуется.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

С осторожностью применять у пациентов с тяжелыми хроническими запорами в анамнезе.

Взрослым терапию препаратом Смекта® в комплексе с мерами по регидратации назначают в случае необходимости.

Комплекс мер по регидратации назначается в зависимости от течения заболевания, возраста и особенностей пациента.

Интервал между приемом Смекты и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

Использование в педиатрии

У детей с острой диареей препарат следует применять в комплексе с мерами по регидратации.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Сведения отсутствуют.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Возможен выраженный запор или безоар.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении Смекта® может уменьшать скорость и степень абсорбции других лекарственных средств. Не рекомендуется принимать препарат одновременно с другими лекарственными средствами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ИПСЕН ФАРМА

Московское представительство
109147 Москва, Таганская ул. 19
Тел.: (495) 258-54-00; Факс: (495) 258-54-01