

ВАЛЕМИДИН® (VALEMIDIN)

зарегистрировано
ЕВРОМЕД ООО (Россия)
произведено
ФАРМАМЕД ООО (Россия)
или АВЗ С-П ООО (Россия)
или КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ **Капли для приема внутрь спиртовые** в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

25 мл

валерианы настойка	8.3 мл
пустырника настойка	8.3 мл
боярышника настойка	4.2 мл
мяты перечной настойка.....	4.2 мл
дифенгидрамин (димедрол)	25 мг

25 мл – флаконы темного стекла (1) с крышкой-капельницей – пачки картонные.

✧ **Капли для приема внутрь спиртовые** в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

50 мл

валерианы настойка	16.6 мл
пустырника настойка	16.6 мл
боярышника настойка	8.4 мл
мяты перечной настойка.....	8.4 мл
дифенгидрамин (димедрол)	50 мг

50 мл – флаконы темного стекла (1) с крышкой-капельницей – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛСР-000057 от 02.05.07

Код АТХ: N05CM

Клинико-фармакологическая группа:

Седативный препарат растительного происхождения

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Оказывает седативное и спазмолитическое действие.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

ПОКАЗАНИЯ

- невроты;
- нейро-циркуляторная дистония по гипертоническому типу.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь, предварительно разведя в небольшом количестве воды, за 30 мин до еды.

Взрослым назначают по 30-40 капель 3-4 раза/сут.

Курс лечения составляет 10-15 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача, но не ранее чем через 1-1.5 мес.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Со стороны пищеварительной системы: редко – диспепсия; при длительном применении – сухость во рту.

Прочие: аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует сообщить об этом врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- выраженные нарушения функции печени;
- выраженные нарушения функции почек;
- артериальная гипотензия;
- брадикардия (менее 55 уд./мин);
- острая сердечная недостаточность;
- хроническая сердечная недостаточность;
- возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых (40 капель) составляет 0.58 г, в максимальной суточной дозе для взрослых (160 капель) – 2.3 г.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат содержит дифенгидрамин и этанол, поэтому в период его применения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении препарата Валемидин® с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (седативные, снотворные, транквилизаторы, нейролептики) возможно взаимное усиление эффектов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта.

ФАРМАМЕД ООО

194292 Санкт-Петербург
5-й Верхний пер. 19, лит. А
Тел.: (812) 647-02-46