

**ВИТАПРОСТ® ФОРТЕ
(VITAPROST FORTE)**

зарегистрировано и произведено
НИЖФАРМ ОАО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ **Суппозитории ректальные** белого с желтоватым, кремового или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы; допускается появление белого налета на поверхности.

1 супп.

экстракт простаты 100 мг,

в пересчете на водорастворимые пептиды 20 мг

Вспомогательные вещества: жир твердый (витепсол, марки H15, W35, суппосир, марки NA15, NAS50) – достаточное количество для получения суппозитория массой 1.25 г.

5 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.

5 шт. – упаковки ячейковые контурные (2) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: ЛС-002488 от 16.03.12

Код АТХ: G04BX

Клинико-фармакологическая группа:

Препарат животного происхождения, применяемый при заболеваниях предстательной железы

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат животного происхождения. Витапрост® форте обладает органотропным действием в отношении предстательной железы. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. На основании данных клинических исследований доказано, что Витапрост® форте умеренно уменьшает объем предстательной железы. Препарат уменьшает выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи.

Витапрост® форте улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет расширения неповрежденных сосудов (эффект вазодилатации), этим способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов. Активация органного кровотока способствует улучшению адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря.

Уменьшением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперактивности мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения Витапрост® форте.

Витапрост® форте способствует нормализации параметров предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Данные о фармакокинетике препарата Витапрост® форте не предоставлены.

ПОКАЗАНИЯ

- хронический простатит;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
- лечение ургентного (императивного) недержания мочи, ургентных (императивных) позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах;
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Применяют ректально по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения или очистительной клизмы кишечника по 1 суп. 1 раз/сут. После введения суппозитория пациенту следует находиться в постели в течение 30-40 мин.

Продолжительность курса лечения врач определяет индивидуально. Минимальная продолжительность курса лечения суппозиториями Витапрост® форте при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* – 15 дней, при *хроническом простатите* – 10 дней, при *гиперактивном мочевом пузыре* – 20 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Очень редко: аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Не применяется.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C. Срок годности – 2 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ШТАДА

603950 Нижний Новгород, Салганская ул. 7

Тел.: (831) 278-80-88; Факс: (831) 430-72-28